

167 *Bolboschoenus maritimus* (L.) Pall.

Ebro Viejo, Quinto (15/07/2013)

***Bolboschoenus maritimus* (L.) Pall.**

NOMBRE VULGAR

Juncia marina

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Hierba con rizomas tuberosos; tallos trígono, al menos hacia el ápice; hojas sin vello; inflorescencia con espiguillas ovoideas generalmente sin pedúnculo; de 2 a 3 brácteas muy desiguales, la inferior mucho más larga que la inflorescencia; glumas dispuestas en espiral, con lóbulos agudos y arista curvada, con vello al menos en márgenes y nervio medio, de color pardo; flores con 3 estambres y 3 estigmas; aquenios obovoideos, de color pardo.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Cyperaceae

Plantas herbáceas, frecuentemente con rizomas.

Tallos simples, cilíndricos o trígono.

Hojas alternas, no espinosas en el margen.

Hojas sentadas y paralelinervias.

Perianto reducido a escamas o cerdas.

Flores protegidas cada una por una sola bráctea, dispuestas en espigas.

Espiguillas solitarias o en inflorescencia.

Inflorescencia cilíndrica, esférica o mazuda.

Inflorescencias masculinas y femeninas separadas, sentadas.

Anteras insertas por su base.

Género *Bolboschoenus*.

Inflorescencia con espigas ovoideas y más de 3 flores.

Inflorescencia con 1 a 4 brácteas muy desiguales.

Perianto formado por cerdas o escamas que son visibles en el fruto.

Glumas dispuestas en espiral, pelosas en el dorso, marcadamente emarginadas y terminadas en punta.

Bolboschoenus maritimus

Inflorescencias con espiguillas mayoritariamente sin pedúnculos.



B. maritimus.
Detalle de espiguillas sin pedúnculos.

167 *Bolboschoenus maritimus* (L.) Pall.**ESPECIES SIMILARES**

Las inflorescencias con espiguillas sin pedúnculos diferencian a esta especie de las demás del género *Bolboschoenus*.

DISTRIBUCIÓN

Europa, excepto en el extremo norte. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de orillas del Ebro y campos de arroz. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Holosciadetum

Scirpetum maritimi littoralis

Soncho-Juncetum maritimi

Suaedetum brevifoliae

Typheto-Schoenoplectetum tabernaemontani



B. maritimus. Detalle del tallo, hojas e inflorescencia

COMENTARIOS Y USOS

Las semillas y tallos tiernos son comestibles, si bien es necesario no confundirlos con algunas especies de *Juncus* que pueden resultar tóxicas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

B. maritimus. Detalle de la raíz



B. maritimus. Detalle del tallo

167 *Bolboschoenus maritimus* (L.) Pall.



B. maritimus. Detalle del tallo y vaina de la hoja



B. maritimus. Detalle de la hoja: haz



B. maritimus. Detalle de la cara ventral de la vaina



B. maritimus. Detalle de la hoja: envés

167 *Bolboschoenus maritimus* (L.) Pall.



B. maritimus. Detalle de la inflorescencia y brácteas



B. maritimus. Detalle de las espiguillas



B. maritimus. Detalle de la inflorescencia



B. maritimus. Detalle de la inflorescencia



B. maritimus. Detalle de espiguillas maduras