

167 *Cyperus difformis* L.

Ebro Viejo, Quinto (21/09/2013)

Cyperus difformis L.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-50 cm. Planta anual, cespitosa. Tallos trígonos. Hojas planas, la mayoría basales y más cortas que los tallos. Inflorescencia terminal. Brácteas desiguales, la inferior mucho más larga que la inflorescencia. Espiguillas lanceoladas, lateralmente aplanadas. Glumas pardo-rojizas con banda central más pálida. Aquenios trígonos, amarillos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Cyperaceae**

Plantas herbáceas, frecuentemente con rizomas.

Tallos simples, cilíndricos o trígonos.

Hojas alternas, no espinosas en el margen.

Hojas sentadas y paralelinervias.

Perianto reducido a escamas o cerdas.

Flores protegidas cada una por una sola bráctea, dispuestas en espigas.

Espiguillas solitarias o en inflorescencia.

Inflorescencia cilíndrica, esférica o mazuda.

Inflorescencias masculinas y femeninas separadas, sentadas.

Anteras insertas por su base.

Género *Cyperus*

Tallos habitualmente trígonos.

Hojas lineares, planas, blandas.

Inflorescencia de color castaño, verdoso o rojizo.

Espiguillas comprimidas, con escamas opuestas e imbricadas, dispuestas regularmente en dos filas.

Flores bisexuales, todas iguales.

Estigmas glabros.

Cyperus difformis

Planta anual, con raíz débil, fibrosa y no reptante.

Glumas 0,5–0,7 mm, obovadas o suborbiculares, rojizas o parduscas, con quilla más pálida.

Inflorescencias umbeliformes, terminales, con numerosas espiguillas.

Espiguillas de 2-8 x 0,8-1 mm.

Fruto blanquecino o amarillento.



C. difformis. Detalle de la inflorescencia y de las espiguillas.

167 *Cyperus difformis* L.



ESPECIES SIMILARES

El ser planta anual, con raíz débil, fibrosa y no reptante y tener glumas 0,5–0,7 mm, obovadas o suborbiculares, rojizas o parduscas, con quilla más pálida, inflorescencias umbeliformes, terminales, con numerosas espiguillas, espiguillas de 2-8 x 0,8-1 mm y fruto blanquecino o amarillento separan a esta especie de las demás del género *Cyperus* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Con origen en el mediterráneo, hoy tiene una distribución subcosmopolita. Encontrada en un campo de arroz en Quinto.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos encharcados y común como “mala hierba” en los campos de arroz. Florece desde junio hasta septiembre.



AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. difformis. Detalle del tallo y vaina de las hojas



C. difformis. Detalle del tallo



C. difformis. Detalle de la hoja: haz y envés

167 *Cyperus difformis* L.



C. difformis. Detalle de la inflorescencia y brácteas



C. difformis. Detalle de las espiguillas



C. difformis. Detalle de las espiguillas



C. difformis. Detalle de la inflorescencia y brácteas



C. difformis. Detalle de una espiguilla