

**167 *Cyperus difformis* L.**

Ebro Viejo, Quinto (21/09/2013)

*Cyperus difformis* L.

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

20-50 cm. Planta anual, cespitosa. Tallos trígonos. Hojas planas, la mayoría basales y más cortas que los tallos. Inflorescencia terminal. Brácteas desiguales, la inferior mucho más larga que la inflorescencia. Espiguillas lanceoladas, lateralmente aplanadas. Glumas pardo-rojizas con banda central más pálida. Aquenios trígonos, amarillos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Cyperaceae**

Plantas herbáceas, frecuentemente con rizomas.

Tallos simples, cilíndricos o trígonos.

Hojas alternas, no espinosas en el margen.

Hojas sentadas y paralelinervias.

Perianto reducido a escamas o cerdas.

Flores protegidas cada una por una sola bráctea, dispuestas en espigas.

Espiguillas solitarias o en inflorescencia.

Inflorescencia cilíndrica, esférica o mazuda.

Inflorescencias masculinas y femeninas separadas, sentadas.

Anteras insertas por su base.

**Género *Cyperus***

Tallos habitualmente trígonos.

Hojas lineares, planas, blandas.

Inflorescencia de color castaño, verdoso o rojizo.

Espiguillas comprimidas, con escamas opuestas e imbricadas, dispuestas regularmente en dos filas.

Flores bisexuales, todas iguales.

Estigmas glabros.

***Cyperus difformis***

Planta anual, con raíz débil, fibrosa y no reptante.

Glumas 0,5–0,7 mm, obovadas o suborbiculares, rojizas o parduscas, con quilla más pálida.

Inflorescencias umbeliformes, terminales, con numerosas espiguillas.

Espiguillas de 2-8 x 0,8-1 mm.

Fruto blanquecino o amarillento.



*C. difformis*. Detalle de la inflorescencia y de las espiguillas.

# 167 *Cyperus difformis* L.



## ESPECIES SIMILARES

El ser planta anual, con raíz débil, fibrosa y no reptante y tener glumas 0,5–0,7 mm, obovadas o suborbiculares, rojizas o parduscas, con quilla más pálida, inflorescencias umbeliformes, terminales, con numerosas espiguillas, espiguillas de 2-8 x 0,8-1 mm y fruto blanquecino o amarillento separan a esta especie de las demás del género *Cyperus* citadas en la Comarca.

## DISTRIBUCIÓN

Con origen en el mediterráneo, hoy tiene una distribución subcosmopolita. Encontrada en un campo de arroz en Quinto.

## HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos encharcados y común como “mala hierba” en los campos de arroz. Florece desde junio hasta septiembre.



## AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*C. difformis*. Detalle del tallo y vaina de las hojas



*C. difformis*. Detalle del tallo



*C. difformis*. Detalle de la hoja: haz y envés

**167 *Cyperus difformis* L.**



*C. difformis*. Detalle de la inflorescencia y brácteas



*C. difformis*. Detalle de las espiguillas



*C. difformis*. Detalle de las espiguillas



*C. difformis*. Detalle de la inflorescencia y brácteas



*C. difformis*. Detalle de una espiguilla