



Miralrío, Gelsa (04/06/2013)

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

NOMBRE VULGAR

Gramón

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba con estolones largos y grupos numerosos de brotes con tallos floríferos a menudo con vellosidad en la parte superior; hojas con lígula de pelos y limbo rígido; espiga densa, con espiguillas cortamente pediceladas; glumas con quilla.

CLAVES DE DETERMINACIÓN División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola. Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada. Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos. Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas. Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes. Filamentos de los estambres unidos a las anteras

Género Aeluropus. Aeluropus littoralis

Plantas de terrenos salinos, perennes.

en su mitad.

Inflorescencia densa, mayor de 1 cm y menor de 5 cm.

Inflorescencia con espiguillas multifloras y pedunculadas, con 4-10 flores, comprimidas lateralmente

Glumas sobrepasadas por las lemas. Lígula reemplazada con pelos.

ESPECIES SIMILARES

El vivir en sitios salinos, formar céspedes densos y tener las lígulas reemplazadas por pelos diferencian a esta especie de otras Gramineae.

DISTRIBUCIÓN

Europa, centro y suroeste de Asia y África boreal. Presente en los suelos salinos de toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de orillas de las lagunas saladas de Sástago y otros suelos salinizados. Florece desde mavo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Limonietum ovalifolii Soncho-Juncetum maritimi Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. littoralis. Céspedes en suelos salinos.



A. littoralis. Detalle del tallo sin inflorescencia



A. littoralis. Detalle del tallo



A. littoralis. Detalle de las lígulas de pelos





A. littoralis. Detalle de la hoja: haz



A. littoralis. Detalle de la hoja: envés



A. littoralis. Detalle del tallo con inflorescencia



A. littoralis. Detalle de la inflorescencia





A. littoralis. Detalle de la espiga



A. littoralis. Detalle de la espiguilla