

169 *Arundo micrantha* Lam.

Talavera, Pina de Ebro (11/10/2013)

Arundo micrantha* Lam.*NOMBRE VULGAR**

Caña borde

DESCRIPCIÓN

2-4 m. Planta erecta, con tallos de hasta 2 cm de diámetro, a menudo inclinados; hojas planas, sin vellosidad, de color verde azulado, de hasta 4 cm de anchas; panícula de hasta 80 cm, con ramas erectas; espiguillas de 6-8 mm, con 1-2 flores; glumas casi iguales, agudas.



A. micrantha. Detalle de la panícula y espiguilla.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Arundo*

Planta con tallo endurecido.

Hojas con lámina bien desarrollada.

Hojas no pecioladas, con lígulas provistas de pelos.

Inflorescencia de entre 30 y 60 cm, densa, ocultando el eje central.

Espiguillas con más de una flor y pelos largos estériles.

Glumas casi iguales.

Arundo micrantha

Puede alcanzar una altura de 4 metros.

Espiguillas de 6-8 mm.

Espiguillas con 1-2 flores.

Pelos de la lema de menos de 5 mm.

169 *Arundo micrantha* Lam.



ESPECIES SIMILARES

Muy parecida a *Arundo donax*, que es de tamaño mayor, panículas más cortas (de hasta 60 cm) y espiguillas de 11-14 mm con 3-5 flores.



A. donax. Detalle de cañar, espiguilla y panícula.

Diferencias entre las espiguillas de *Arundo donax* a la izquierda y *Arundo micrantha* a la derecha.



DISTRIBUCIÓN

Es una caña autóctona que se distribuye por la Cuenca mediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos profundos y húmedos en terrazas del Ebro y orillas de campos y acequias. Florece desde septiembre hasta noviembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA




A. micrantha. Detalle del tallo y lígula

169 *Arundo micrantha* Lam.



A. micrantha. Detalle de la lígula



A. micrantha. Detalle de una hoja: envés



A. micrantha. Detalle de una hoja: haz

169 *Arundo micrantha* Lam.



A. micrantha. Detalle de la panícula



A. micrantha. Detalle de la espiguilla