

169 *Puccinellia festuciformis* (Host.) Parl.

Trancar; Pina de Ebro (25/05/2013)

Puccinellia festuciformis (Host) Parl.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

30-60 cm. Hierba perenne. Hojas basales en su mayoría, con limbro enrollados. Panícula piramidal con ramas patentes. Espiguillas comprimidas lateralmente con pedúnculo ligeramente engrosado. Glumas desiguales, menores que las flores con márgenes levemente denticulados. Lema papiráceo con el dorso redondeado y peloso en la mitad inferior. Pálea igual al lema en longitud. Anteras amarillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Puccinellia*

Plantas de terrenos húmedos y salinos.

Limbo plano, al menos en el ápice.

Espiguillas con más de 3 flores.

Glumas y lemas obtusas, no aquilladas, más cortas que las flores.

Lemas redondeadas en el dorso, con 5 nervisos.

Puccinellia festuciformis

Hojas con el margen fuertemente revuelto, con 1 mm de anchura.



P. festuciformis. Inflorescencia y espiguilla

169 *Puccinellia festuciformis* (Host.) Parl.**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas con el margen fuertemente revoluta con 1 mm de anchura separan a esta especie de las demás del género *Puccinellia* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie circummediterránea. Encontrada en un suelo salinizado en el término de Pina; seguramente esta presente también en otros suelos salinos de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos y salinos. Florece desde junio hasta agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. festuciformis. Detalle del tallo



P. festuciformis. Detalle de la hoja: haz

169 *Puccinellia festuciformis* (Host.) Parl.



P. festuciformis. Detalle de la hoja: envés



P. festuciformis. Detalle de la lígula



P. festuciformis. Inflorescencia

169 *Puccinellia festuciformis* (Host.) Parl.



P. festuciformis. Espiguilla