

169 *Puccinellia rupestris* (With.) Fern. & Weath.

Trancar; Pina de Ebro (01/06/2013)

***Puccinellia rupestris* (With.) Fern. & Weath.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Hierba con hojas con limbo plano. Panícula estrechamente elipsoidal, con ramas patentes y espiguillas desde la base. Espiguillas compriidas lateralmente, estrechamente elípticas. Glumas desiguales, menores que las flores. Lema papiráceo con el dorso redondeado y provisto de pelos cortos. Pálea igual al lema en longitud. Anteras amarillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Gramineae

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Puccinellia*

Plantas de terrenos húmedos y salinos.

Limbo plano, al menos en el ápice.

Espiguillas con más de 3 flores.

Glumas y lemas obtusas, no aquilladas, más cortas que las flores.

Lemas redondeadas en el dorso, con 5 nervisos.

Puccinellia rupestris

Hojas planas mayores de 2 mm de anchura.

Inflorescencia con verticilos inferiores brevemente pedunculados.

Lema mayor de 3 mm.

Espiguilla mayor de 6 mm.



P. rupestris. Inflorescencia y espiguilla

169 *Puccinellia rupestris* (With.) Fern. & Weath.**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas planas mayores de 2 mm de anchura, inflorescencia con verticilos inferiores brevemente pedunculados, lema mayor de 3 mm y espiguilla mayor de 6 mm separan a esta especie de las demás del género *Puccinellia* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie eurosiberiana. Encontrada en un suelo salinizado en el término de Pina; seguramente esta presente también en otros suelos salinos de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos y salinos. Florece desde junio hasta agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. rupestris. Detalle del tallo




P. rupestris. Detalle de la hoja: haz

169 *Puccinellia rupestris* (With.) Fern. & Weath.



P. rupestris. Detalle de la hoja: envés



P. rupestris. Detalle de la lígula



P. rupestris. Inflorescencia

169 *Puccinellia rupestris* (With.) Fern. & Weath.



P. rupestris. Espiguilla