

169 *Stipa parviflora* Desf.

Farlé; Pina de Ebro (13/05/2013)

***Stipa parviflora* Desf.**

NOMBRE VULGAR

Hopillo

DESCRIPCIÓN

30-100 cm. Hierba con hojas con lámina convoluta, de haz pubescente o piloso; lígula escábrida. Panícula laxa. Espiguillas unifloras, con pedúnculos de más de 5 mm, flexuosos y escábridos; glumas desiguales, la superior aguda, la inferior setácea; lema pubescente; arista 7-13 cm, bigeniculada, escábrida; pálea aguda, de dorso pubescente. Anteras glabras en el ápice.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Stipa*

Lígula membranosa.

Espiguillas todas similares, sin haces de pelos largos.

Lema glabra o con pelos cortos, con arista muy aparente de 1 a 30 cm de longitud..

Arista de más de 1 cm de longitud, marcadamente articulada, con el artejo basal retorcido.

Stipa parviflora

Inflorescencia laxa, con pedúnculos alargados y espiguillas bien individualizadas.

Espiguillas pequeñas, con glumas desiguales, menores de 2 cm.

Lema de 4-7 mm de longitud.

Aristas no plumosas.



S. parviflora. Inflorescencia y espiguilla

169 *Stipa parviflora* Desf.**ESPECIES SIMILARES**

El tener la inflorescencia laxa, con pedúnculos alargados y espiguillas bien individualizadas, espiguillas pequeñas, con glumas desiguales, menores de 2 cm, lema de 4-7 mm de longitud y aristas no plumosas, separa a esta especie de las demás del género *Stipa* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie propia del mediterráneo suroccidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de zonas esteparias, en pastizales secos y soleados. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Helianthemetum squamati

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Ononidetum tridentatae

Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae

Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

Sideritetum cavanillesii



S. parviflora. Detalle del tallo

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Formación de *S. parviflora*



S. parviflora. Detalle de hojas basales

169 *Stipa parviflora* Desf.



S. parviflora. Detalle de la hoja: haz



S. parviflora. Inflorescencia




S. parviflora. Detalle de la hoja: envés



S. parviflora. Espiguilla

169 *Stipa parviflora* Desf.



S. parviflora. Espiguilla