

169 *Trisetum loeflingianum* (L.) C. Presl

La Retuerta; Pina de Ebro (27/04/2013)

***Trisetum loeflingianum* (L.) C. Presl**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

8-25 cm. Hierba con hojas pubescentes, con pelos largos en los márgenes de la vaina; lámina plana; lígula aguda. Panícula laxa y contraída. Espiguillas comprimidas lateralmente, por lo general con 2 flores; glumas desiguales, a veces ligeramente teñidas de púrpura, membranáceas, aquilladas, la inferior uninervada y estrecha, la superior más larga que las flores, trinervada; arista acodada, inserta en el tercio superior.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Gramineae

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Trisetum*

Lígula membranosa.

Espiguillas con más de una flor y todas las flores aristadas.

Espiguillas menores de 7 mm de longitud.

Lema con arista claramente dorsal, partiendo de su base.

Trisetum loeflingianum

Plantas anuales con todos los tallos floríferos.

Inflorescencia de 1 cm de anchura y de 1 a 4 de larga.

Arista con anchura más o menos homogénea.



T. loeflingianum.
Inflorescencia

169 *Trisetum loeflingianum* (L.) C. Presl**ESPECIES SIMILARES**

El ser plantas anuales y tener todos los tallos floríferos, inflorescencia de 1 cm de anchura y de 1 a 4 de larga y arista con anchura más o menos homogénea, separa a esta especie de las demás del género *Trisetum* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie circummediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de terrenos baldíos y claros de matorrales muy pastoreados en zonas esteparias ricas en yeso. Florece desde mayo hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

T. loeflingianum. Detalle del tallo y hojas



T. loeflingianum. Inflorescencia