

**035 *Aspicilia contorta* (Lecanorales)**

Vireta, Pina de Ebro (28/07/2016)

**NOMBRE VULGAR**

-

**NOMBRE CIENTÍFICO**

*Aspicilia contorta* (Hoffm.) Krempelh.

**DESCRIPCIÓN**

Talo gris verdoso con aréolas separadas y convexas que luego se fusionan y se vuelven más pálidas. El prótalo es indistinto. Los apotecios son discos negros inmersos, a menudo cubiertos de pruina blanco-azulada y generalmente individuales en el centro de cada aréola. Ascospores de 4-8, esporas de  $22-26 \times 15-19 \mu\text{m}$ .

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento holártico. Encontrado en la base del tronco de una sabina albar (*Juniperus thurifera*) y sobre piedra caliza.

**COMENTARIOS Y USOS**

Es un líquen muy común en todos los ambientes de Aragón. Puede encontrarse sobre hormigón o piedras de cal, siendo interesante su hallazgo en los pies del tronco de una sabina albar.

**AGRADECIMIENTO**

Javier Etayo Salazar (Pamplona) ha determinado los ejemplares fotografiados.

**BIBLIOGRAFÍA**

Calatayud, V. & Sanz, M.J., 2000. *Guía de líquenes epífitos*. Ed. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Etayo, J., 2010. Líquenes y hongos liquenícolas de Aragón. *Guineana*, 16: 1-501

Etayo, J. & Blasco-Zumeta, J., 1992. - Líquenes epífitos de zonas áridas. El sabinar de la Retuerta de Pina (Los Monegros, España). *Acta Botánica Malacitana*, 17: 67-78

<http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-33.html>

## 035 *Aspicilia contorta* (Lecanorales)



*L. horiza* sobre tronco de sabina albar  
(*Juniperus thurifera*)