

035 *Psora saviczii* (Lecanorales)

Fuente del Noble, Pina de Ebro
(16/10/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Psora saviczii (Tomin) Follm. & Crespo

DESCRIPCIÓN

Talo con escuámulas irregulares rosáceas y cubiertas por una capa de pruina blanca, con margen revoluto; apotecios convexos, insertos marginalmente, con margen caduco; disco negro, de superficie mate; himenio rosado; ascos octosporados.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento íbero-turánico. Aparece sobre yesos en zonas abiertas.

COMENTARIOS Y USOS

Es una especie con disyunción en su distribución ya que aparece en las estepas rusas y las pseudoestepas del valle del Ebro y de la Meseta, al sur de Madrid. Soporta bien la insolación apareciendo en zonas abiertas.

AGRADECIMIENTO

Javier Etayo Salazar (Pamplona) ha determinado los ejemplares fotografiados.

BIBLIOGRAFÍA

Etayo, J., 2010. Líquenes y hongos liquenícolas de Aragón. *Guineana*, 16: 1-501

Etayo, J. & Blasco-Zumeta, J., 1992 .- Líquenes epifitos de zonas áridas. El sabinar de la Retuerta de Pina (Los Monegros, España). *Acta Botánica Malacitana*, 17: 67-78

Miadlikowska, J., Kauff, F., Högnabba, F., Oliver, J. C., Molnár, K., Fraker, E., & Stenroos, S., 2014. A multigene phylogenetic synthesis for the class Lecanoromycetes (Ascomycota): 1307 fungi representing 1139 infrageneric taxa, 317 genera and 66 families. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 79, 132-168.

Ozenda, P. & Clauzade, G., 1970. *Les lichens. Étude biologique et flore illustrée*. Ed. Masson et Cte.. Paris.

<http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55360>