

065 *Agonimia octospora* (Verrucariales)



DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento cosmopolita. Encontrado sobre *Orthotrichum diaphanum* en corteza de sabina albar (*Juniperus thurifera*)

COMENTARIOS Y USOS

Es un líquen habitualmente encontrado sobre musgos saxícolas.

AGRADECIMIENTO

Javier Etayo Salazar (Pamplona) ha determinado los ejemplares fotografiados.

BIBLIOGRAFÍA

Etayo, J., 2010. Líquenes y hongos liquenícolas de Aragón. *Guineana*, 16: 1-501

Ozenda, P. & Clauzade, G., 1970. *Les lichens. Étude biologique et flore illustrée*. Ed. Masson et Cte.. Paris.

http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A2/Agonimia_octospora.htm

La Retuerta, Pina de Ebro (16/07/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Agonimia octospora Coppins & P. James

DESCRIPCIÓN

Talo formado por escuámulas verdosas (gris verdoso cuando está seco), muy pequeñas (0,1-0,3 mm), ± coraloides, formando un cojín alargado y extendido sobre el sustrato. Corteza superior del talo con papilas de 1-2 μ m de altura. Fotosimbionte: alga verde (Trentepohlia). Peritecios: no se han observado. Raramente presente según la literatura, ± incrustado en el talo, negro, liso, con ascos de 8 esporas, 60-85 x 20-30 μ m, incoloro.

065 *Agonimia octospora* (Verrucariales)



V. nigrescens. Detalle