

070 *Agrocybe aegerita* (Agaricales)

Casco urbano, Pina de Ebro (03/11/2021)

NOMBRE VULGAR

Seta de chopo

NOMBRE CIENTÍFICO

Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer

DESCRIPCIÓN

Talla media-pequeña. Sombrero carnoso con arrugas en la cutícula, seco, ni escamoso ni pruinoso. Cutícula ondulada de color pardo (más o menos oscuro) a miel amarillento, marrón oliváceo o chocolate-pardo oscuro, que con la edad aclara a beige-blanquecino. Láminas estrechas, carnosas, blanquecinas-color arcilla, de maduras concoloras con el sombrero. Pie largo, estrecho, cilíndrico, fibroso, duro, curvado, amarillento. Pedicelo no separable (homogénea). Anillo persistente. Polvo esporal color marrón tabaco. Carne compacta, sabrosa, olor a harina o ligeramente ácido.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento sureuropeo. Encontrada en el césped de un jardín municipal junto a un álamo blanco (*Populus alba*).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es un hongo saprófito de árboles de hoja caduca en sotos (sauces, chopos, álamos, olmos, morenas ...). La denominación, pues, de seta de chopo no es estrictamente exacta por poder vivir en otras especies. Se cultiva y comercializa todo el año, por sus propiedades medicinales y gastronómicas, si bien deben desecharse los ejemplares adultos, que saben a madera. Se recomienda guisarla con carnes de cocción prolongada, pues menos hecha resulta dura.

AGRADECIMIENTOS

Luis José García Erla determinó el ejemplar de la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

Moreno, G., García Manjón, J.L. & Zugaza, A., 1986. La Guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Vols. I y II. Ed. INCAFO. Madrid

<http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/Aportaciones018/Geastrum%20fimbriatum.pdf>

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. aegerita