

135 *Fuligo cinerea* (Physarales)



La Arboleda, Pina de Ebro (27/10/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan

DESCRIPCIÓN

Carpóforo en forma de plasmodio mucilaginoso o masa espumosa reticulada, de varios cms. de longitud (recuerda a leche cuajada), color blanco-sucio que puede virar a violáceo. En los primeros estadios de plasmodio, los etalios dejan al moverse un rastro mucoso o hipotalo. Tras madurar, la carne se convierte en una masa pulverulenta irregular de color más oscuro y textura más dura, cubierta por una red de color blanco-sucio. Carece de pie, se adhiere directamente al sustrato. Esporada negra, esporas marrón-

GALERÍA FOTOGRÁFICA



F. cinerea



F. cinerea

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento cosmopolita. Encontrado en un tronco caído de chopo (*Populus nigra*).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Aparece esta especie sobre todo a finales del verano y durante todo el otoño, siendo relativamente frecuente. Fructifica sobre madera muerta, pequeñas ramitas, o directamente sobre la hierba.

AGRADECIMIENTOS

Luis José García Erla determinó el ejemplar de la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

Moreno, G., García Manjón, J.L. & Zugaza, A., 1986. La Guía de Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Vols. I y II. Ed. INCAFO. Madrid

<https://www.fichasmicologicas.com/index.php?id=16&art=1546>