


130 *Proctostephanus dalii* (Collembola, Isotomidae)

P. dalii. Quetotaxia dorsal. Copia del dibujo original utilizado en la descripción de la especie. Fuente: Arbea (2003)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Proctostephanus dalii Arbea, 2003

DESCRIPCIÓN

1,5-2 mm, coloración parduzca, con pigmento azul en forma de manchas por los terguitos, cabeza y alrededor de los ojos y antenas; granulación tegumentaria fina; cabeza con ocho o más corneolas, órgano postantenal ovalado con un diámetro del doble de una corneola; palpo maxilar simple; revestimiento de los terguitos muy abundante; macrosedas poco diferenciadas; ; terguitos con sensilas cortas y finas; uña sin dientes.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Endemismo ibérico. Se han localizado ejemplares en la Retuerta de Pina y en la Comarca de la Serranía, en Valencia

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Se encontraron 3 hembras, 2 machos y 4 juveniles obtenidos con un embudo Berlese con humus rdecogido bajo sabina albar (*Juniperus thurifera*).

Javier Arbea dedicó la especie al pintor Salvador Dalí, artista que en los años 60 dedicó su atención a los colémbolos, realizando algún grabado de ellos.

BIBLIOGRAFÍA

Arbea, J.I., 2003. El género *Proctostephanus* Börner, 1902 en la Península ibérica, con descripción de una nueva especie de la región mediterránea de España (Collembola: Isotomidae). *Bol. S.E.A.*, 32: 5-8.

Arbea, J. & Blasco-Zumeta, J., 2001. Ecología de los Colémbolos (Hexapoda, Collembola) en Los Monegros (Zaragoza, España). *Bol. S.E.A.*, 28: 35-48

AGRADECIMIENTO

A Javier Arbea estudió y describió el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.