

200 *Laemobothrion maximum* (Phthiraptera, Laemobothriidae)



En pluma de buitre leonado (*Gyps fulvus*); Pina de Ebro (15/11/2016)

NOMBRE VULGAR

-

Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763)

DESCRIPCIÓN

Macho 7,78-8-51 mm, hembra 8,90-10,03 mm. Cabeza con el margen anterior plano. Esclerito sitóforo de la hipofaringe con la estructura en forma de U reducida. Zona próximo-dorsal del 2º fémur con menos de 5 sedas espiniformes. Ausencia de grandes áreas sin pigmentación a lo largo de la línea media de los terguitos abdominales. Área postvulvar de la hembra sin manchas pigmentadas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Especie cosmopolita. Encontrada en Pina en un ejemplar juvenil de buitre leonado (*Gyps fulvus*)

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es una especie propia de la familia Accipitriidae: buitres, milanos, azores, gavilanes, aguiluchos y águilas.

BIBLIOGRAFÍA

Martín Mateo, M.P., 2002. *Mallophaga, Amblycera*. En: *Fauna ibérica*, vol. 20. Ramos, M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



L. maximum



L. maximum

200 *Laemobothrion maximum* (Phthiraptera, Laemobothriidae)



L. maximum