

210 Oxycarenus lavaterae (Hemiptera, Oxycarenidae)

Casco urbano; Pina de Ebro (20/09/2021). En *Hibiscus syriacus*

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787)

DESCRIPCIÓN

4-6 mm. Los insectos adultos son en su mayoría de color rojo, blanco y negro. La cabeza, todo el protórax, el escutelo y las antenas son negros. La parte superior del abdomen es de color rojo ladrillo, mientras que el connexivum es negruzco. Las alas delanteras son incoloras y transparentes y llegan hasta la parte superior del abdomen o son un poco más largas. Las ninfas se reconocen fácilmente por su cabeza negra y el abdomen de color rojo. Las almohadillas de las alas de las ninfas son completamente negras.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo en origen, ha sido introducido en otras partes del mundo. Presente en toda la Comarca allá donde se encuentran las malváceas de las que se alimenta.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es una chinche que se alimenta de plantas de la familia Malvaceae (orden Malvales) como *Lavatera*, *Althaea*, *Malva* o *Hibiscus*, pero si estas no están presentes fácilmente acude a otras plantas, como por ejemplo algunos árboles frutales. En invierno suele formar agrupaciones de individuos.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:

<http://tubiologia.forosactivos.net/> .

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxycarenus_lavaterae

<https://tubiologia.forosactivos.net/t7962-oxycarenus-lavaterae?highlight=oxycarenus>