

220 *Ditomus tricuspидatus* (Coleoptera, Carabidae)



Farlé; Pina de Ebro (01/08/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Ditomus tricuspидatus (Fabricius, 1792)

DESCRIPCIÓN

11-15 mm. Color oscuro, salvo las patas y antenas castaño-rojizo; élitros fuertemente acanalados con las estría impares con vellosidad y las pares lisas; machos con una especie de prolongación aplanada en el centro de la cabeza y unas extravagantes mandíbulas afiladas, curvadas y lateralmente aplanadas; las hembras con cabezas más similares a las del resto de los carábidos, sin esos extraños apéndices.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Macho con una prolongación aplanada en el centro de la cabeza y con mandíbulas afiladas, curvadas y lateralmente aplanadas. Hembra con cabezas similares a las del resto de los carábidos.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo. Presente principalmente en ambientes de secano.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Herrera, L. & Arricibita, F.J., 1990. Los carábidos de Navarra, España (Coleoptera, Carabidae). *Entomograph*, 12: 1-248

Perrier, R., , L., 1977. *La Faune de la France. Coléoptères (première partie)*. Ed. Lib. Delagrave. Paris.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:

GALERÍA FOTOGRÁFICA



D. tricuspидatus

220 *Ditomus tricuspoidatus* (Coleoptera, Carabidae)



D. tricuspoidatus