

220 *Oxythyrea funesta* (Coleoptera, Scarabaeidae)



Agudicos; Pina de Ebro (20/06/2016)

NOMBRE VULGAR

Escarabajo del sudario

NOMBRE CIENTÍFICO

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

DESCRIPCIÓN

8-10 mm. color negro brillante, a veces bronceo, moteado de blanco y cubierto de cerdas blancas y largas. Pronoto decorado con manchas blancas y con 3 manchas situadas a una y otra parte de una carena central. Élitros también provistos de numerosas motas blancas simétricas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo. Presente principalmente en ambientes de secano.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Las larvas se alimentan de materia vegetal en descomposición según unos textos, otros hablan de raíces. Los adultos son fitófagos y se alimentan del néctar y el polen de múltiples plantas (prácticamente todas las que estén en flor cuando emerge el escarabajo adulto). También se pueden comer las propias flores (órganos florales), especialmente cuando hay escasez de polen y néctar, provocando entonces daños a las plantas.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:

<http://tubiologia.forosactivos.net/> .

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Perrier, R., , L., 1977. *La Faune de la France. Coléoptères (deuxième partie)*. Ed. Lib. Delagrave. Paris.

<https://www.asturnatura.com/especie/oxythyrea-funesta.html>

<https://miblogdebichos.wordpress.com/coleopteros/cetoniidae/oxythyrea-funesta-poda-1761/>

GALERÍA FOTOGRÁFICA




O. funesta

220 *Oxythyrea funesta* (Coleoptera, Scarabaeidae)



O. funesta



O. funesta



O. funesta



O. funesta