

220 Polydrusus sp. (Coleoptera, Curculionidae)



Deslinde; Pina de Ebro (12/05/2025)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Polydrusus sp.

DESCRIPCIÓN

4-10 mm. Habitualmente de color verde amarillento (algunas especies son doradas o marrones) , con escamas sobre fondo negro. Cuerpo **ovalado y compacto**, levemente aplanado dorsoventralmente, velloidad pequeña oscura en zona dorsal, tibias más oscuras que los fémures, ojos negros y antenas con aspecto barrado por alternancia de artejos con vello gris y sin él.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Encontrado un solo ejemplar en el Deslinde, barriendo sobre cardos marianos (*Silybum marianum*)

AGRADECIMIENTO

Antonio Velázquez determinó el ejemplar fotografiado.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Los adultos emergen del suelo a finales del invierno o principios de primavera. La duración de su etapa adulta suele ser de 2 a 3 meses, dependiendo de las especies.

La oviposición ocurre en plantas huésped, sobre hojas o base del tallo, preferentemente en primavera. Las larvas eclosionan en pocos días y descienden al sustrato del suelo, donde se desarrollan, alimentándose de raíces de gramíneas, compuestas, rosáceas y otras plantas huésped.

Al final del verano, las nuevas generaciones de adultos comienzan a aparecer en los árboles y arbustos. Tras su aparición, estos adultos se refugian para invernar en el suelo hasta la siguiente primavera.

Se han unas 220 especies a nivel mundial, de las que en España se han citado más de 18. No es posible determinar este género a nivel específico utilizando una fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

<http://iberfauna.mncn.csic.es/showficha.aspx?rank=T&idtax=42578>

<https://www.naturalezaparatodos.es/2016/08/01/polydrusus-sp>



Polydrusus sp.