

220 *Protaetia morio* (Coleoptera, Scarabaeidae)

Agudicos; Pina de Ebro (20/06/2016)

NOMBRE VULGAR

Cetonia negra

NOMBRE CIENTÍFICO

Protaetia morio (Fabricius, 1781)

DESCRIPCIÓN

58-100 mm. Cuerpo es redondeado y compacto, de más de 1 cm, con crestas resaltadas en los élitros, un escudete triangular relativamente grande y color negro salpicado de manchitas claras, pequeñas e irregulares.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo occidental. Presente principalmente en ambientes de secano.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

El adulto es un visitante habitual de los grandes capítulos de los cardos de las plantas del género *Centaurea*. Las larvas viven escondidas en el suelo, alimentándose de raíces. Transcurren 4 años en estadio de larva, antes de convertirse en adultos. Por este motivo, en los lugares que habita suele observarse una inusual población de adultos periódicamente cada 4 años.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:

<http://tubiologia.forosactivos.net/> .

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Perrier, R., , L., 1977. *La Faune de la France. Coléoptères (deuxième partie)*. Ed. Lib. Delagrave. Paris.

<https://elmedinaturaldelbages.cat/es/species/cetonia-negra-netocia-morio-es/>

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. morio


220 *Protaetia morio* (Coleoptera, Scarabaeidae)



P. morio



P. morio



P. morio