

230 *Cylindromya auriceps* (Diptera, Tachinidae)



Vireta; Pina de Ebro (04/07/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Cylindromya auriceps (Meigen, 1838)

DESCRIPCIÓN

10-18 mm. Abdomen cilíndrico. Los tergitos ventrales son de color naranja rojizo, a menudo con una estrecha banda longitudinal negra, que puede ser continua o interrumpida; la punta del abdomen es negra. Abdomen generalmente con cerdas discales. En el escutelo hay dos cerdas apicales cruzadas, una importante característica diagnóstica de la especie. En el escutum generalmente dos bandas longitudinales anchas y dos estrechas entre ellas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento euromediterráneo. Encontrado en ambientes esteparios.

AGRADECIMIENTO

Theo Zeegers (Holanda) determinó los ejemplares fotografiados.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.


Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Séguy, E., 1951. *Atlas des Diptères de France*. Vols. I-II. Ed. N. Boubée. Paris.

<https://insektarium.net/diptera-2/tachinidae-raczykowate/cylindromya-auriceps-walcownica/>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. auriceps



C. auriceps

230 *Cylindromya auriceps* (Diptera, Tachinidae)



C. auriceps



C. auriceps