

230 *Gymnosoma rungsi* (Diptera, Tachinidae)



La Retuerta; Pina de Ebro (04/07/2016). Hembra

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Gymnosoma rungsi (Mesnil, 1952)

DESCRIPCIÓN

10-18 mm. Las vibrisas se reducen a una en cada lado, a veces totalmente ausentes; placa fronto-orbital casi siempre la mayoría de las veces desnuda en la mitad anterior; abdomen generalmente anaranjado.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Macho con 3º y 4º tergito abdominal con una pequeña mácula circular en cada uno (raramente completamente naranjas). Hembra con una mácula negra semitriangular en cada uno.



G. rungsi. Determinación del sexo. Diseño del abdomen: izquierda macho; derecha hembra

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico occidental y mediterráneo . Encontrado en ambientes esteparios.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Los adultos se alimentan de néctar de diversas flores. Las larvas son parásitas de diversas especies de chinches como *Aelia rostrata* (Pentatomidae) o *Eurygaster maura* (Scutelleridae).

AGRADECIMIENTO

Theo Zeegers (Holanda) determinó los ejemplares fotografiados.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Gilasian, E., Talebi, A.A., Ziegler, J., Manzari, S. & Parchami-Araghi, M. 2017. New records of the subfamily Phasiinae (Diptera: Tachinidae) from Iran. *Journal of Insect Biodiversity and Systematics*, 3(1): 7–19.

Séguy, E., 1951. *Atlas des Diptères de France*. Vols. I-II. Ed. N. Boubée. Paris.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



G. rungsi. Hembra

230 *Gymnosoma rungsi* (Diptera, Tachinidae)



G. rungsi. Macho



G. rungsi. Macho