

# 230 *Helophilus trivittatus* (Diptera, Syrphidae)



Contienda; Pina de Ebro (11/09/2016). Macho

## NOMBRE VULGAR

-

## NOMBRE CIENTÍFICO

*Helophilus trivittatus* (Fabricius, 1805)

## DESCRIPCIÓN

10-25 mm de envergadura. Rostro amarillo, sin bandas oscuras; tibias de las patas medias amarillas; fémur de las patas posteriores de color negro; tórax oscuro, con grandes bandas longitudinales blanquecinas.

## DETERMINACIÓN DEL SEXO

Machos con las manchas amarillas del 3º terguito sin tocar el margen frontal. Hembras con las manchas amarillas del 3º terguito tocando el margen frontal

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico occidental. Como las larvas son acuáticas, los adultos son más frecuentes en flores junto a puntos de agua, si bien pueden encontrarse igualmente en lugares alejados de la misma.

## COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Las larvas son acuáticas y detritívoras, asociadas a rizomas en descomposición de aneas (*Typha* sp.) y algunas algas. Los adultos son florícolas habiéndose citado en numerosos tipos de flores.

## BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Bruce, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

<http://www.naturespot.org.uk/content/id-guide-helophilus>

## AGRADECIMIENTO

Piluca Álvarez (Madrid) determinó el ejemplar de la fotografía.

## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*H. trivittatus*. Macho



*H. trivittatus*. Macho