

237 *Pyralis farinalis* (Lepidoptera, Pyralidae)



Casco urbano; Pina de Ebro (23/06/2020)

NOMBRE VULGAR

Polilla parda de la harina

NOMBRE CIENTÍFICO

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

18-30 mm de envergadura alar. Alas anteriores de coloración parda dividida transversalmente en 3 segmentos por ala. Los segmentos aparecen divididos por líneas claras delgadas de trazo curvilíneo. Alas posteriores también trisegmentadas separadas por líneas curvas de color claro, si bien estos segmentos están menos diferenciados que en las alas anteriores.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Especie de distribución cosmopolita debido a dispersión antrópica. Propia de espacios humanos alimentándose de cereales almacenados.

PLANTA NUTRICIA

Se considera una plaga por alimentarse del grano almacenado; trigo y cereales sobre todo.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

La hembra deposita un promedio de 250 huevos. Las larvas son de color crema, sin vellosidades, y con cabeza marrón; En los hogares los restos de comida (migas de pan o de galletas, comida de perros que queden debajo de la encimera o del frigorífico, etc.), atrae a esta especie.

AGRADECIMIENTO

Víctor Redondo Veintemillas determinó los ejemplares de la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Bruce, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

García-Barros, E. et al., 2013. *Lepidoptera Papilionoidea*. En: *Fauna Ibérica*, vol. 37. Ramos, M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

Redondo, V.M., Blasco-Zumeta, J. & King, G.E., 2001. Macrolepidópteros de un sabinar de *Juniperus thurifera* L. en Los Monegros, Zaragoza, España (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. lepid.*, 29 (116): 323-370