

240 Anthophora dispar (Hymenoptera, Apidae)

Casco urbano; Pina de Ebro (05/03/2022). Macho

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Anthophora dispar Lepeletier, 1841

DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL SEXO

14-16 mm. Macho con metatarsos posteriores engrosados. Metatarso y último tarsómero de las patas intermedias con pinceles. Espacio malar bien desarrollado. Frecuentemente hay pinceles de pelos en algún artejo de los tarsos intermedios.

Hembra con clipeo sin quilla central; en lugar de ésta, puntuación gruesa y esparcida. Borde de los terguitos de color castaño oscuro translúcido, con bandas apicales de pilosidad blanca. Escopa amarillo-ferrugínea. La pilosidad del tórax forma una banda entre las tégulas que queda mal definida o desaparece por la existencia de muchos pelos a su alrededor. Clipeo y labro negro.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento normediterráneo. Presente en todos los ambientes de la Comarca.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Machos y hembras tienen un patrón de coloración tan diferente que parecen especies distintas y de ahí su nombre específico “*dispar*”. Los adultos vuelan desde finales de invierno hasta principios de primavera para aprovechar las plantas de floración temprana.

AGRADECIMIENTO

Gonzalo Agudo determinó el ejemplar fotografiado.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Ortiz-Sánchez, F. J. & Jiménez-Rodríguez, A.J., 1991. Actualización del catálogo de las especies españolas de Anthophorini (Hymenoptera, Anthophoridae). *Boln, Assoc. esp. Ent.*, 15: 297-31

[https://](https://biocostagranadinafauna.blogspot.com/2014/05/abeja-de-lengua-larga-anthophora-dispar.html)

biocostagranadinafauna.blogspot.com/2014/05/abeja-de-lengua-larga-anthophora-dispar.html