

017 *Anodonta anatina* (Unionoida, Unionidae)

Acequia de Pina; Pina de Ebro (15/10/2014)

NOMBRE VULGAR

-

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

Concha de hasta 20 cm. Concha delgada y muy frágil, ovalada y alargada; color pardo amarillento con franjas radiales verdosas; charnela sin dientes.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento europeo. Presente en el cauce del Ebro y algunas acequias que guardan agua todo el año.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Anodonta anatina vive en todo tipo de ríos y lagos, habitualmente en fondos blandos de cieno y aguas remansadas, aunque también puede vivir en gravas y zonas de corriente. Es una de las náyades menos exigentes en cuanto al hábitat, probablemente por tener un amplio rango de peces hospedadores. Mantiene los gloquidios en las branquias durante todo el invierno y solamente la branquia externa actúa como marsupio. Los gloquidios maduran en otoño y se liberan en primavera, siendo de color pardo amarillento. Entre las especies hospedadoras de sus gloquidios en la península Ibérica se han señalado al barbo, la madrilla, el pez fraile y las bogas. Aunque se trata de una especie dioica, recientemente se ha visto que pueden existir ejemplares hermafroditas. Como el resto de náyades, se trata de una especie en franca regresión.

AGRADECIMIENTO

Ramón Manuel Álvarez Halcón (Zaragoza) determinó el ejemplar de la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

Araujo, R. *et al.*, 2009. Las náyades de la península Ibérica. *Iberus*, 27(2): 7-72

Larraz, M.L., 1993. Moluscos terrestres y acuáticos de Navarra (Norte de la Península Ibérica). *Publicaciones de Biología de la Universidad de Navarra. Serie Zoológica*, 23: 1-326

VV.AA., 2012. *Moluscos acuáticos de la Cuenca del Ebro*. Ed. Confederación Hidrográfica del Ebro. Zaragoza

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. anatina