

035 *Aculepeira armida* (Araneae, Araneidae)



Valtravesera; Pina de Ebro (24/06/2016)

NOMBRE VULGAR

-

Aculepeira armida (Audouin, 1826)

DESCRIPCIÓN

Macho 8 mm, hembra 13 mm. Prosoma de color pardo oscuro con pubescencia blanca; ojos medios anteriores más próximos entre ellos que de los laterales; patas de color pardo con anillos negros: opistosoma ovalado, fusiforme, con bandas longitudinales dorsales blancas, negras y rojizas; ventralmente, con una banda blanca sobre fondo negro.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. Presente principalmente en zonas con matorral bajo en ambientes de seco.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es una araña que gusta de zonas de escasa altitud, normalmente asociada a praderas, pastos, eriales y cunetas. La tela es vertical, con el centro excéntrico a unos 50 cm de altura del suelo y el refugio ubicado en la vegetación adyacente, para esconderse de sus depredadores. Los adultos son abundantes al final de la primavera y en verano, estación donde copulan y posteriormente realizan la puesta.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Jones, D., 1983. *Guía de campo de los arácnidos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Martínez, F.D., Fernández, C., Alemany, C. & Gilgado, J.D., 2010. *Arañas del Campus*. Cuadernos del Campus Naturaleza y Medio Ambiente, nº 6. Universidad de Alcalá. Madrid.

Perrier, R., 1975. *La Faune de la France*. Arachnides et Crustacés. Ed. Jos. Adam. Bruxelles.

AGRADECIMIENTO

Antonio Melic (Sociedad Entomológica Aragonesa, SEA) determinó el ejemplar fotografiado.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. armida