



**055** *Scapheremaeus patella* (Oribatida, Cymbaeremaeidae)



*Scapheremaeus patella* . 2: aspecto dorsal sin patas; 3: aspecto ventral  
 Copia del dibujo original utilizado en la redescrición de la especie. Fuente: Pérez-Íñigo, 1995

**NOMBRE VULGAR**

-

*Scapheremaeus patella* (Berlese, 1886)

**DESCRIPCIÓN**

Macho 463 µm; hembra 514 µm. Borde rostral del pronoto entero, pero ligeramente ondulado; cabeza casi esférica, oscura; setas lamelares cortas y gruesas, las setas rostrales son más finas y cortas; la región central del notogaster cubierto de crestas irregulares; valvas genitales con seis setas cada una; la superficie del lado ventral está cubierta por setas largas y tortuosas.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**AGRADECIMIENTO**

Carlos Pérez-Íñigo estudió el material de oribátidos colectados en la Retuerta.

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento mediterráneo. Se ha encontrado en Grecia, Siera Espuña (Murcia) y de forma habitual en el sabinar de La Retuerta de Pina.

**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

En La Retuerta se ha colectado principalmente barriendo vegetación, habiendo sido localizada sobre las siguientes plantas: *Brachypodium retusum*, *Genista scorpius*, *Juniperus phoenicea*, *Juniperus thurifera*, *Lygeum spartum*, *Osyris alba*, *Pinus halepensis*, *Quercus coccifera*, *Rhamnus lycioides*, *Salsola vermiculata* ; pero también con una trampa Wikening colocada en el tronco de un pino carrasco y bajo la escama de un Coccoidea.

**BIBLIOGRAFÍA**

Pérez-Íñigo, C., 1995 .- Oribátidos (Acari, Oribatei) hallados sobre plantas en la región de Los Monegros (Aragón, España). *Misc. Zool.*, 18: 41-46